

Gamander-Ehrenpreis (*Veronica chamaedrys*), Braunwurzgewächse (Rachenblütler)

Blütezeit: April - Juni

Höhe: 15-30cm



Beide Bilder: Wilhelm Zimmerling PAR - Own work, CC BY-SA 4.0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=78502734>

Blütenblätter leicht abfallend, blau mit dunkleren Adern, Stängel
niederliegend oder aufsteigend. Laubblätter gegenständig, kurz
gestielt, behaart

Haare am Spross nur in zwei Reihen

Zeigerwerte nach Ellenberg

L6	TX	F5	RX	NX
----	----	----	----	----

Efeu-Gundermann (*Glechoma hederacea*), Lippenblütengewächse

Blütezeit: März-Mai

Höhe: 15-60 cm



vierkantiger
Stängel, kriechend
oder aufsteigend,

Blätter
nierenförmig oder
fast herzförmig

wenige Blüten,
deren Oberlippe
flach ist
(Lippenblüter)

Zeigerwerte nach Ellenberg

L6	T6	F6	RX	N7
----	----	----	----	----

Weißer Wucherblume, gemeine Margerite
(*Leucanthemum vulgare*), Korbblütengewächse

Blütezeit: Mai-Oktober

Höhe: 30-60 cm



Sehr häufig, Blüten in einzelnen endständigen Köpfchen, außen weiße Zungenblüten, innen gelbe Röhrenblüten.

Stängel aufrecht

Laubblätter gekerbt (unten) bis gesägt (weiter oben)

Zeigerwerte nach Ellenberg

L7	Tx	F4	RX	N3
----	----	----	----	----

Gemeine Schafgarbe (*Achillea millefolium*), Korbblütengewächse

Blütezeit: Juni-Oktober

Höhe: 15-60 cm



Laubblätter doppelt
fiederteilig,



Blüten in kleinen
Körbchen angeordnet

Pflanze duftet aromatisch

Zeigerwerte nach Ellenberg

L8	TX	F4	RX	N5
----	----	----	----	----

Gemeines Leimkraut (*Silene vulgaris*),

Nelkengewächse

Blütezeit: Juni-August

Höhe: 20-50 cm



Blütenblätter auf etwa 1/3 eingeschnitten, Blütenkelch aufgeblasen, netzadrig

Stängel aufrecht, nicht klebrig, Laubblätter schmal und gegenständig

reichlich Nektar, wird durch Nachtschmetterlinge bestäubt

Zeigerwerte nach Ellenberg

L8	TX	F4w	R7	N2
----	----	-----	----	----

Scharfer Hahnenfuß (*Ranunculus acris*),

Hahnenfußgewächse

Blütezeit: Mai-Oktober

Höhe: 30-120 cm

Bei der Unterscheidung von anderen Hahnenfußarten muss man auf
Details und den Standort achten!



linkesBild:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Scherpe_boterbloem_plant_%28Ranunculus_acris%29.jpg

Bild vom gepressten Hahnenfuß: A. Nonenmacher - Own work, CC BY-SA 4.0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=76750725>

rechtes Bild: CC BY-SA 3.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=115591>

Zeigerwerte nach Ellenberg

L7	TX	FX	RX	NX
----	----	----	----	----

Großer Sauer-Ampfer (*Rumex acetosa*), Knöterichgewächse

Blütezeit: Mai-Juni

Höhe:30-80cm



Samenbildung

Linkes Bild von Hajotthu, CC BY-SA 3.0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19094488>

Zeigerwerte nach Ellenberg

L8	TX	FX	RX	N6
----	----	----	----	----

Spitz-Wegerich (*Plantago lanceolata*),

Wegerichgewächse

Blütezeit: Mai-Oktober

Höhe: 5-60cm



oben: Blütenstände



oben: Laubblätter lang und
spitz zulaufend

rechtes Bild: Samenbildung



Zeigerwerte nach Ellenberg

L6	TX	FX	RX	NX
----	----	----	----	----

Gemeines Hirtentäschelkraut (*Capsella bursa-pastoris*), Kreuzblütengewächse

Blütezeit: März-Oktober

Höhe: 20-40 cm



Früchte dreieckig bis keilförmig
grundständige Blatt-Rosette

linkes Bild: Wikicommons, Eike Wulfmeyer,
2004-MAY-22, Cologne (Germany)

Zeigerwerte nach Ellenberg

L7	TX	F5	RX	N6
----	----	----	----	----

Acker-Schachtelhalm, Zinnkraut (*Equisetum arvense*)

Schachtelhalmgewächse

Höhe: 10-50 cm



ungeschlechtliche Vermehrung durch unterirdische Ausläufer
sowie durch Sporenbildung

Zeigerwerte nach Ellenberg

L6	TX	F6w	RX	N3
----	----	-----	----	----

Gewöhnliche Zaun-Winde (*Calystegia sepium*), Windengewächse

Blütezeit: Juni-Oktober

Höhe: 150-300 cm



Nur Einzelexemplar an dem Standort

Laubblätter gestielt, am Blattgrund pfeilförmig, Pflanze windend,
Blüten 3,5 – 6 cm, geruchlos

Zeigerwerte nach Ellenberg

L8	T6	F6	R7	N9
----	----	----	----	----

Jakobs-Kreuzkraut, Jakobs-Greiskraut (*Senecio jacobaea*), Korbblütengewächse

Blütezeit: Juli-Oktober

Höhe: 30-100 cm



rechtes Bild: Stefan.lefnaer

<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=55920571>

Stängel aufrecht, kantig, gerillt, meist braun-rot überlaufen,
Laubblätter fiederteilig, etwas spinnwebig behaart

Zeigerwerte nach Ellenberg

L8	T5	F4w	R7	N5
----	----	-----	----	----

Wald-Erdbeere (*Fragaria vesca*), Rosengewächse

Blütezeit: Mai-Juni

Höhe: 5-20 cm



Stängel behaart, mit 3-10 aufrechten weißen Blüten,

5 Blütenblätter berühren sich gegenseitig, Blüte 1-1,5 cm

Blattstiele bis 10 cm, Laubblätter dreiteilig

Pflanze mit langen Ausläufern. Erdbeer-Frucht bis 2 cm

Zeigerwerte nach Ellenberg

L7	TX	F5	RX	N6
----	----	----	----	----

Rapunzel-Glockenblume (*Campanula rapunculus*), Glockenblumengewächse

Blütezeit: Juni-August

Höhe: 30-80 cm

Blüten sind NICHT zu einer
Seite gewendet

Kelchblätter sind fast bis auf
den Grund rund
ausgebuchtet



Zeigerwerte nach Ellenberg

L7	T7	F4	R6	N4
----	----	----	----	----

Quelle der Zeigerwerte: http://botanik.mettre.de/Campanula_rapunculus.shtml

Rot-Klee, Roter Wiesenklee (*Trifolium pratense*), Schmetterlingsblütengewächse

Blütezeit: Juni-Oktober

Höhe: 15-30 cm



Quelle: CC BY-SA 2.5,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=196821>

Blüten wohlriechend, Stängel aufsteigend oder aufrecht, meist
zwei Blüten, häufig, wichtige Futterpflanze

Zeigerwerte nach Ellenberg

L7	TX	FX	RX	NX
----	----	----	----	----

Acker-Hornkraut (*Cerastium arvense*),

Nelkengewächse

Blütezeit: April-August

Höhe: 10-30cm



linkes Bild: By Wilhelm Zimmerling PAR - Own work, CC BY-SA 4.0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=78110101>

rechtes Bild: GPL, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1061487>

Blütenblätter über 8 mm lang, nur bis $\frac{1}{4}$ eingekerbt, doppelt so lang wie die Kelchblätter

Laubblätter gegenständig, länglich, Pflanze stark kurz behaart

Zeigerwerte nach Ellenberg

L8	TX	F4	R6	N4
----	----	----	----	----

Folgende Pflanzen sind an Ihrem Standort 3
(Hügelwiese) vertreten

Wiesen-Platterbse (*Lathyrus pratensis*), Schmetterlingsblütengewächse

Blütezeit: Juni-August.

Höhe: 20-50 cm



rechtes Bild: By Stefan.Iefnaer - Own work, CC BY-SA 4.0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=55069496>

Zeigerwerte nach Ellenberg

L7	T5	F6	R7	N6
----	----	----	----	----

Gemeiner Rainkohl (*Lapsana communis*),

Korbblütengewächse

Blütezeit: Mai-September

Höhe: 20-120 cm



Blütenkörbchen 1-1,5 cm Durchmesser, Stängel kahl, reich an Ästen

Zeigerwerte nach Ellenberg

L5	T6	F5	RX	N7
----	----	----	----	----

Mauer-Zimbelkraut (*Cymbalaria muralis*),

Braunwurzgewächse

Blütezeit: April - September

Höhe: Stängel sind fadenförmig, kletternd, hängend, kriechend,
bis 60 cm lang



herzförmige Laubblätter meist an der Unterseite rötlich gefärbt

linkes Bild: Luis Fernández García, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=86271643>
rechtes Bild (Blüte) von Wilhelm Zimmerling,
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ruhland,_Grenzstr._3,_Mauer-Zimbelkraut_im_Garten,_Bl%C3%BCte,_Fr%C3%BChling,_02.jpg

Zeigerwerte nach Ellenberg

L7	T7	F5	R8	N3
----	----	----	----	----

Quelle für die Ellenberg-Zahlen: http://botanik.mettre.de/Cymbalaria_muralis.shtml

Kleine Bibernelle (*Pimpinella saxifraga*),

Doldengewächse

Blütezeit: Juni-Oktober

Höhe: 15-50 cm

Blüten in zusammengesetzten Dolden,

Laubblätter einfach gefiedert, Stängel nahezu rund, NICHT
scharfkantig gefurcht wie bei der großen Bibernelle



linkes Bild by Udo Schmidt from Deutschland - *Pimpinella saxifraga*

L.Uploaded by Amada44, CC BY-SA 2.0,

<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24356150>

rechtes Bild Udo Schmitdt, wikicommons

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pimpinella_saxifraga_L._\(8070509708\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pimpinella_saxifraga_L._(8070509708).jpg)

unteres Bild biedrzeńec mniejszy skalny, wikicommons

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pimpinella_saxifraga_subsp._rupestris.jpg

Zeigerwerte nach Ellenberg

L7	TX	F3	RX	N2
----	----	----	----	----

Schwalbenwurz (*Vincetoxicum hirundinaria*), Schwalbenwurzgewächse

Blütezeit: Juni-August

Höhe: 30-60 cm

Stängel aufrecht,

Blüten weiß, in den Blatt-
achseln stehend

Große Laubblätter, die kurz
gestielt sind



CC BY-SA 3.0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=199011>

Zeigerwerte nach Ellenberg

L6	T5	F3	R7	N3
----	----	----	----	----

Pfirsichblättrige Glockenblume (*Campanula persicifolia*),

Glockenblumengewächse

Blütezeit: Juni-Juli

Höhe: 70-120 cm

Laubblätter sehr schmal (bis
1 cm), Blüten 2,5-4 cm groß
und zu einer Seite gewendet



By Algirdas at the Lithuanian language Wikipedia, CC BY-SA 3.0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6704888>

Zeigerwerte nach Ellenberg

L5	T5	F4	R8	N3
----	----	----	----	----

Gewöhnlicher Dost, Wilder Majoran (*Origanum vulgare*), Lippenblütengewächse

Blütezeit: Juli-Oktober

Höhe: 30-60cm



CC BY-SA 3.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31021>

Zeigerwerte nach Ellenberg

L7	TX	F3	R8	N3
----	----	----	----	----

Gemeine Waldrebe (*Clematis vitalba*),

Hahnenfußgewächse

Blütezeit: Juni – Juli

Lange, windende Triebe, auch durch Büsche hindurch

unten: auffällige Früchte
(Herbst und Winter)



linkes Bild:

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=Clematis%20vitalba&title=Special%3ASearch&ns0=1&ns6=1&ns12=1&ns14=1&ns100=1&ns106=1#/media/File:Clématite_fruits01.jpg

rechtes Bild: by Burkhard Mücke - Own work, CC BY-SA 4.0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34047265>

Zeigerwerte nach Ellenberg

L7	T6	F5	R7	N7
----	----	----	----	----

Blauroter Steinsame (*Buglossoides purpureocaerulea*), Borretschgewächse

Blütezeit: April-Juni

Höhe: 10-50 cm



linkes Bild:

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=Buglossoides+purpureocaeruleum&title=Special:Search&ns0=1&ns6=1&ns12=1&ns14=1&ns100=1&ns106=1#/media/File:Buglossoides_purpureocaeruleum.jpg

rechtes Bild by Meneerke bloem - Own work, CC BY-SA 3.0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10437220>

Zeigerwerte nach Ellenberg

L5	T7	F4	R7	N4
----	----	----	----	----

**Gewöhnlicher Glatthafer (*Arrhenatherum elatius*),
Süßgräser**



Zeigerwerte nach Ellenberg

L8	T5	F5	R7	N7
----	----	----	----	----

Flug-Hafer (*Avena fatua*),

Süßgräser

Blütezeit: Juni - August

Höhe: 40-120 cm



Flug-Hafter wächst in lockeren Büscheln oder mit einzeln stehenden Halmen.

Die Blätter: kahl, lediglich die untersten sind häufig zerstreut behaart, 10 bis 50 cm lang, 4 bis 10 mm breit, flach ausgebreitet, rau sowie am Grund und am Rand kurz behaart.

Blütenstand: 10 bis 40 cm lang, Durchmesser von bis zu 20 cm, pyramidenförmig. Der Blütenstand ist locker, gleichseitwendig und trägt hängende Ährchen.

Linkes Bild: Dominique REMAUD - <http://www.tela-botanica.org/eflore/consultation/popup.php?module=popup-illustrations&action=fiche&referentiel=bdtfx&id=91914>, CC BY-SA 2.0 fr,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=60005900>

Rechtes Bild: Stefan.lefnaer - Own work, CC BY-SA 4.0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=73680920>

Zeigerwerte nach Ellenberg

L6	T6	F5	R7	NX
----	----	----	----	----

Acker-Kratzdiestel (*Cirsium arvense*),

Korbblütengewächse

Höhe: 30-150cm

Blütezeit: Juli bis Oktober



Stängel: ist reich beblättert, meistens verzweigt

Laubblätter: buchtig gezähnt und haben dornige Wimpern

Im oberen Stängelbereich sind die Blätter jedoch nicht stachelig

Blüte: Blütenkörbchen mit Durchmesser von ca. 2 cm, lila-rötlich

Linkes Bild:

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=Cirsium%20arvense&title=Special%3ASearch&ns0=1&ns6=1&ns12=1&ns14=1&ns100=1&ns106=1#/media/File:Acker-Kratzdistel_Cirsium_arvense_0168.jpg

Rechtes Bild: kallerna - Own work, CC BY-SA 3.0,

<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7293659>

Zeigerwerte nach Ellenberg

L8	T5	FX	RX	N7
----	----	----	----	----

Folgende Pflanzen sind an Ihrem Standort 3
(Hügelwiese) vertreten

Wiesen-Knäuelgras, Knäuelgras (*Dactylis glomerata*),

Süßgräser

Höhe: bis 120cm

Blütezeit: Mai – Juli oder länger



oben links: blühendes Knäuelgras

Links unten: AfroBrazilian - Own work, CC BY-SA 3.0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19914571>

Links oben: foxypar4 on Flickr - Flickr, CC BY 2.0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6312839>

rechtes Bild: By Prazak - Own work, CC BY-SA 3.0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=840546>

Zeigerwerte nach Ellenberg

L7	TX	F5	RX	N6
----	----	----	----	----

Kleine Wiesenraute (*Thalictrum minus*),

Hahnenfußgewächse

Höhe: bis 150cm!

Blütezeit: Mai - August



Laubblätter: bläulich-grün, mehrfach gefiedert mit rundlichen bis keilförmigen Abschnitten.

Blütenstände: aufrecht oder nickend, rispenartig, auffallend gelbe Staubblätter

Linkes Bild:

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?=-thalictrum+minus&sort=relevance&search=thalictrum+minus&title=Special%3ASearch&profile=advanced&fulltext=1&advancedSearch-current=%7B%7D&ns0=1&ns6=1&ns12=1&ns14=1&ns100=1&ns106=1#/media/File:Thalictrum_minus_-_habit.jpg

Rechtes Bild: Radio Tonreg from Vienna, Austria - Thalictrum minus Uploaded by Jacopo Werther, CC BY 2.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25210852>

Zeigerwerte nach Ellenberg

L6	TX	F3	R8	N3
----	----	----	----	----