

Folgende Pflanzen  
sind an **Standort 2** vertreten.

## Einblütiges Perlgras (*Melica uniflora*), Süßgräser

Blütezeit: Mai - Juni

Höhe: bis 60 cm



sommergrünes Gras, Halme mehr oder weniger schlaff, aufrecht  
oder überhängend, nur wenige Blätter tragend

Blätter bis 20 cm lang, 7mm breit, hellgrün, spitz zulaufend

Blüte: sehr lockere Rispe (rechtes Bild)

Zeigerwerte nach Ellenberg

L3	T5	F5	R6	N6
----	----	----	----	----

linkes Bild: Donkey shot - Own work, CC BY-SA 4.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40452370>

rechtes Bild: Gilles San Martin from Namur, Belgium - *Melica uniflora* Uploaded by Jacopo Werther, CC BY-SA 2.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24612195>

Folgende Pflanzen  
sind an **Standort 2** vertreten.

## Efeu-Gundermann (*Glechoma hederacea*), Lippenblütengewächse

Blütezeit: März-Mai

Höhe: 15-60 cm



vierkantiger  
Stängel, kriechend  
oder aufsteigend,

Blätter  
nierenförmig oder  
fast herzförmig

wenige Blüten,  
deren Oberlippe  
flach ist (daher der  
Name der Familie  
Lippenblüter)

Zeigerwerte nach Ellenberg

L6	T6	F6	RX	N7
----	----	----	----	----

Bild: [https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/Glechoma\\_hederacea\\_resize.jpg](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/Glechoma_hederacea_resize.jpg)

Folgende Pflanzen  
sind an **Standort 2** vertreten.

## Busch-Windröschen (*Anemone nemorosa*),

### Hahnenfußgewächse

Blütezeit: März-April

Höhe: 15-25 cm



Blüten entspringen  
einzeln aus einem  
Hochblattquirl

Blütenblätter kahl oder  
wenig behaart

Am Wurzelstock oft ein  
handförmiges,  
grundständiges Blatt

### Zeigerwerte nach Ellenberg

LX	TX	FX	RX	NX
----	----	----	----	----

Bild: [https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/Anemone\\_nemorosa\\_4\\_RF.jpg](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/Anemone_nemorosa_4_RF.jpg)

Folgende Pflanzen  
sind an **Standort 2** vertreten.

## Knoblauchsrauke (*Alliaria officinalis*),

### Kreuzblütengewächs

Blütezeit: Mai-Juni

Höhe: 20-100 cm



Pflanze riecht  
beim Zerreiben  
stark nach  
Knoblauch

Trugdoldige  
Traube

Stängel aufrecht

Blätter ungeteilt;  
untere  
langgestielt,  
nieren-  
herzförmig, grob  
gekerbt; obere  
Blätter herz-  
eiförmig, buchtig  
gezähnt

Zeigerwerte nach Ellenberg

L5	T6	F5	R7	N9
----	----	----	----	----

Bild: [https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cc/Alliaria\\_petiolata\\_2\\_RF.jpg](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cc/Alliaria_petiolata_2_RF.jpg)

Folgende Pflanzen  
sind an **Standort 2** vertreten.

**Seltsamer Lauch, Berliner Bär-Lauch (*Allium paradoxum*),**

**Amaryllisgewächse**

Blütezeit: März-Mai

Höhe: 15-30 cm



Stängel: ohne Blätter, dreikantig

Laubblätter: meist nur eins, manchmal drei, die grundständig sind (auf dem Boden beginnend, ohne Stiel), 20 cm lang, 0,5 – 2,5 cm breit

Blüten: 2 – 10 langgestielte Blüten (Bild Mitte), bilden Brutzwiebeln (rechtes Bild)

Aus dem Kaukasus und Iran eingebürgert, in Hannover besonders in der Eilenriede hinter der Musikhochschule

Zeigerwerte nach Ellenberg

L6	T6	F5	R7	N7
----	----	----	----	----

linkes Bild: Botaurus - Own work - 26 April 2010, Public Domain,  
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10187587>

mittleres Bild: [https://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=Allium+paradoxum&title=Special:Search&no=1&ns6=1&ns12=1&ns14=1&ns100=1&ns106=1#/media/File:Allium\\_paradoxum\\_02.JPG](https://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=Allium+paradoxum&title=Special:Search&no=1&ns6=1&ns12=1&ns14=1&ns100=1&ns106=1#/media/File:Allium_paradoxum_02.JPG)

rechtes Bild: Jean-Marc Pascolo - Own work, CC BY-SA 3.0,  
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32424922>

Folgende Pflanzen  
sind an **Standort 2** vertreten.

## Kletten-Labkraut (*Galium aparine* L.),

### Rötegewächse

Blütezeit: Juni-August

Höhe: 30-130 cm



Blüten: weiß oder  
grünlichweiß

Blütenstände in  
den Blattachseln,  
länger als die  
Blätter

Blätter: Keilförmig-  
länglich,  
stachelspitzig,  
stehen zu 6-8 in  
einem Quirl

Stängel:  
vierkantig, mithilfe  
von rauen Haaren  
kletternd

### Zeigerwerte nach Ellenberg

L7	T5	FX	R6	N8
----	----	----	----	----

Bild: [https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/20130501Wiesen-Labkraut\\_Kisselwiesen2.jpg](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/20130501Wiesen-Labkraut_Kisselwiesen2.jpg)

Folgende Pflanzen  
sind an **Standort 2** vertreten.

**Efeu-Ehrenpreis (*Veronica hederifolia* L.),**

**Braunwurzgewächse**

Blütezeit: März-Mai

Höhe: 5-30 cm



Blüten: einzeln,  
blattachselständig,  
2-5 mm im  
Durchmesser,  
blau oder violett,  
seltener weißlich

Blätter: drei- bis  
siebenlappig,  
behaart

Stängel: liegend  
oder aufsteigend

Zeigerwerte nach Ellenberg

L6	T6	F5	R7	N7
----	----	----	----	----

Bild: [https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/Veronica\\_hederifolia\\_Kasernenplatz-Bern-2.jpg](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/Veronica_hederifolia_Kasernenplatz-Bern-2.jpg)

Folgende Pflanzen  
sind an **Standort 2** vertreten.

**Feld-Ahorn (*Acer campestre*),**

**Seifenbaumgewächse**

Blütezeit: April-Mai

Fruchtreife: September-Oktober

Höhe: Strauch oder bis 20 m hoher Baum



Blätter stumpf 5-lappig, die unteren Lappen sehr klein

Früchte aus 2 Fruchtblättern gebildet, Fruchtblätter einander gegenüberstehend

Zeigerwerte nach Ellenberg

L(5)	T7	F5	R7	N6
------	----	----	----	----

Bild links:

[https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/78/Ruhland%2C\\_Grenzstr.%2C\\_Wald\\_hinter\\_Hausnr.\\_3%2C\\_Feldahorn%2C\\_Zweig\\_mit\\_Bl%C3%A4ttern%2C\\_Fr%C3%BChling%2C\\_02.jpg](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/78/Ruhland%2C_Grenzstr.%2C_Wald_hinter_Hausnr._3%2C_Feldahorn%2C_Zweig_mit_Bl%C3%A4ttern%2C_Fr%C3%BChling%2C_02.jpg)

Bild rechts: [https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/31/2019-06-16\\_ND\\_Feldahorn\\_in\\_Stemwede-Levern\\_%28NRW%29.jpg](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/31/2019-06-16_ND_Feldahorn_in_Stemwede-Levern_%28NRW%29.jpg)

Folgende Pflanzen  
sind an **Standort 2** vertreten.

## Spitz-Ahorn (*Acer platanoides* L.),

### Seifenbaumgewächse

Blütezeit: April-Mai

Fruchtreife: Oktober

Höhe: 20-30 m hoher Baum



Blätter 5-lappig, Lappen grannenartig-spitz auslaufend

Fruchtblügel einander fast gegenüberstehend

Borke längsrissig, schwarzbraun

Zeigerwerte nach Ellenberg

L(4)	T6	FX	RX	NX
------	----	----	----	----

Bild rechts: [https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2c/Friedhof\\_Ruhland%2C\\_Winterlinde\\_in\\_Spitzahorn-Gabel%2C\\_Fr%C3%BChling%2C\\_01.jpg](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2c/Friedhof_Ruhland%2C_Winterlinde_in_Spitzahorn-Gabel%2C_Fr%C3%BChling%2C_01.jpg)

Bild links: [https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7e/Ruhland%2C\\_Brauhausplatz%2C\\_Spitzahorn-Zweigende\\_mit\\_Bl%C3%A4ttern\\_und\\_Fr%C3%BChten%2C\\_Sommer%2C\\_02.jpg](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7e/Ruhland%2C_Brauhausplatz%2C_Spitzahorn-Zweigende_mit_Bl%C3%A4ttern_und_Fr%C3%BChten%2C_Sommer%2C_02.jpg)

Folgende Pflanzen  
sind an **Standort 2** vertreten.

## Gemeine Hasel (*Corylus avellana*),

### Birkengewächse

Blütezeit: Februar-April

Fruchtreife: August-September

Höhe: 2-6 m hoher Strauch (vom Grund an vielstämmig)



Blätter ungeteilt, Blattrand gesägt oder gezähnt, mit 5-15 mm langem, drüsig behaartem Blattstiel, wechselständig

Blüten eingeschlechtig, Männliche Blütenstände vor dem Laubaustrieb blühend

Früchte zu 1-3 beieinander; Nüsse aus dem Fruchtkbecher ragend

Zeigerwerte nach Ellenberg

L6	T5	FX	RX	NX
----	----	----	----	----

Bild links: [https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/Corylus\\_avellana.jpg](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/Corylus_avellana.jpg)

Bild rechts:

[https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5c/Corylus\\_avellana\\_showing\\_secondary\\_stems.\\_Holehouse\\_Holm%2C\\_River\\_Ayr%2C\\_East\\_Ayrshire.jpg](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5c/Corylus_avellana_showing_secondary_stems._Holehouse_Holm%2C_River_Ayr%2C_East_Ayrshire.jpg)

Folgende Pflanzen  
sind an **Standort 2** vertreten.

## Gemeine Esche (*Fraxinus excelsior*), Ölbaumgewächse

Blütezeit: Mai

Fruchtreife: September-Oktober

Höhe: 25-40m hoher Baum



Blätter: Fiedern 5-13, nur die Endfieder lang gestielt, 20-30cm lang

Früchte: geflügelt, an vorjährigen Zweigabschnitten

Knospen: schwarz

Zeigerwerte nach Ellenberg

L(3)	T5	F5	RX	NX
------	----	----	----	----

Bild links: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Fraxinus-excelsior-male-leaves.JPG>

Bild mitte: [https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/Fraxinus\\_excelsior\\_4560.jpg](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/Fraxinus_excelsior_4560.jpg)

Bild rechts: [https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/19/Buds\\_of\\_Fraxinus\\_excelsior\\_03.jpg](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/19/Buds_of_Fraxinus_excelsior_03.jpg)

Folgende Pflanzen  
sind an **Standort 2** vertreten.

## Gefleckter Aronstab (*Arum maculatum* L.),

### Aronstabgewächse

Blütezeit: April-Juni

Höhe: 15-50 cm



Blüten stehen  
unten an einem  
Keulenförmigen  
Kolben, der von  
einem  
grünlichweißen  
Hüllblatt umgeben  
wird

Blätter pfeilförmig,  
oft ganz schwach  
dunkelgrün bis  
braun gefleckt

Zeigerwerte nach Ellenberg

L3	T6	F7	R7	N8
----	----	----	----	----

Bild: [https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/Arum\\_maculatum\\_RF.jpg](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/Arum_maculatum_RF.jpg)

Folgende Pflanzen  
sind an **Standort 2** vertreten.

## Stinkender Storchschnabel (*Geranium robertianum*), Storchschnabelgewächse

Blütezeit: Juni-Oktober

Höhe: 25-50 cm



Blüten: zu zweien,  
rosenrot

Blütenblätter mit  
drei weißlichen  
Längsstreifen

Stängel: rot  
überlaufen,  
kriechend bis  
aufsteigend,  
behaart

Blatt: aus drei völlig getrennten Teilblättchen, diese  
fiederschnittig-gelappt

Pflanze riecht beim Zerreiben leicht widerlich

Zeigerwerte nach Ellenberg

L4	TX	FX	RX	N7
----	----	----	----	----

Bild: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/66/Rombergpark-100516-13017-Ruprechtskraut.jp>

Folgende Pflanzen  
sind an **Standort 2** vertreten.

## Gemeine Hainbuche (*Carpinus betulus*), Birkengewächse

Blütezeit: Juni

Fruchtreife: September-Oktober

Höhe: bis 25 m hoher Baum



Blätter bis 15 mm lang gestielt, mit länglich-elliptischer, 5-10 cm langer, am Rand doppelt gesägter Spreite

Seitennerven der Blätter parallel, unterseits sehr erhaben

Nussfrucht einem asymmetrischen, 3-lappigen Blattorgan ansitzend, Fruchtstände 6-15 cm lang

Borke glatt, mit längs verlaufendem Netzmuster

L(4)	T6	FX	RX	NX
------	----	----	----	----

Bild oben: [https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/Carpinus\\_betulus\\_MHNT.BOT.2004.0.494.jpg](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/Carpinus_betulus_MHNT.BOT.2004.0.494.jpg)

Bild unten: [https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/Haagbeuk\\_dubbelgezaagd\\_blad\\_Carpinus\\_betulus.jp](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/Haagbeuk_dubbelgezaagd_blad_Carpinus_betulus.jp)

Bild rechts: [https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/Carpinus\\_betulus\\_%27Fastigiata%27\\_by\\_Line1.jpg](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/Carpinus_betulus_%27Fastigiata%27_by_Line1.jpg)

Folgende Pflanzen  
sind an **Standort 2** vertreten.

## Gemeiner Efeu (*Hedera helix L.*),

### Araliengewächse

Blütezeit: Februar-April

Fruchtreife: September-Oktober

Höhe: am Boden kriechender oder an Bäumen und Wänden bis 20m hoch aufsteigender Kletterstrauch



Blätter: gelappt, netzartig geädert

Blüten: in kugeligen Dolden, im Herbst erscheinend

Früchte: blauschwarz, oben abgeflacht, mit bleibendem Griffel

Zeigerwerte nach Ellenberg

L(4)	T5	F5	RX	NX
------	----	----	----	----

Bild links: [https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d7/Hedera\\_helix.JPG](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d7/Hedera_helix.JPG)

Bild rechts: [https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0a/Klimop\\_bloeiend\\_%28Hedera\\_helix%29.jpg](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0a/Klimop_bloeiend_%28Hedera_helix%29.jpg)

Bild unten: [https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/Efeu%2C\\_Fr%C3%BCchte.jpg](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/Efeu%2C_Fr%C3%BCchte.jpg)

Folgende Pflanzen  
sind an **Standort 2** vertreten.

**Stiel-Eiche (*Quercus robur*),**

**Buchengewächse**

Blütezeit: April-Mai

Fruchtreife: September-Oktober

Höhe: 30-40m hoher Baum



Blätter: fast sitzend, mit breiten Buchten

Frucht: Eicheln, Fruchtstände lang gestielt, Früchte vom Fruchtkelch zu 1/3 umhüllt

Zeigerwerte nach Ellenberg:

(In der Datei „Fotos von Standort 1“ sehen Sie eine große, alte, beschädigte Eiche in einer **Lichtung** stehen)

L(7)	T6	FX	RX	NX
------	----	----	----	----

Bild links: [https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/Quercus\\_robur\\_3\\_RF.jpg](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/Quercus_robur_3_RF.jpg)

Bild rechts: [https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/77/Lustenau-Hasenfeld-Quercus\\_robur-08ESD.jp](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/77/Lustenau-Hasenfeld-Quercus_robur-08ESD.jp)

Folgende Pflanzen  
sind an **Standort 2** vertreten.

## Gemeines Hexenkraut (*Circaea lutetiana* L.),

### Nachtkerzengewächse

Blütezeit: Juli-August

Höhe: 20-60 cm



Blütenstiele ohne  
Tragblätter

Blätter behaart,  
matt, eiförmig-  
lanceollich

Endständige  
Traube, Blüten  
weiß oder  
schwach rosa

Stängel aufrecht  
oder aufsteigend,  
behaart

Zeigerwerte nach Ellenberg

L4	T5	F6	R7	N7
----	----	----	----	----

Bild: [https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/Circaea\\_lutetiana\\_subsp.\\_lutetiana\\_sl10.jpg](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/Circaea_lutetiana_subsp._lutetiana_sl10.jpg)

Folgende Pflanzen  
sind an **Standort 2** vertreten.

**Rote Johannisbeere (*Ribes rubrum*),**

**Stachelbeergewächse**

Blütezeit: April-Mai

Fruchtreife: Juni-Juli

Höhe: 1-2m hoher Strauch



Blätter: 3-5-lappig

Blüte: in hängenden Trauben, grünlich-braun

Früchte: Kugelförmig, leuchtend rot, durchscheinend, essbar

Zeigerwerte nach Ellenberg

L4	TX	F8	R6	N6
----	----	----	----	----

Bild links: [https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/RSerbentas\\_Ribes\\_rubrum.jpg](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/RSerbentas_Ribes_rubrum.jpg)

Bild rechts: [https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/Ribes\\_rubrum\\_B.jpg](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/Ribes_rubrum_B.jpg)

Bild unten: [https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/Rode\\_bessen\\_%28Ribes\\_rubrum%29.jpg](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/Rode_bessen_%28Ribes_rubrum%29.jpg)

Folgende Pflanzen  
sind an **Standort 2** vertreten:

## Schwarzer Holunder (*Sambucus nigra*),

### Moschuskrautgewächse

Blütezeit: Juni

Fruchtreife: August-September

Höhe: 5-7m hoher Strauch oder bis 10m hoher Baum



Blätter: lang gestielt, mit 7 kurz  
zugespitzten Fiedern

Blüten: in dichten, reichblütigen Ständen

Früchte: schwarz glänzend

Zeigerwerte nach Ellenberg

L7	T5	F5	RX	N9
----	----	----	----	----

Bild oben: CC BY-SA 3.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=295312>

Bild unten rechts: Willow - Own work, CC BY 2.5,  
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2643905>

Bild unten links: CC BY-SA 3.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=856335>